



Grandes Cultures

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

DLP 12-11-01009002

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

AUVERGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°16 du 23 mai 2001 - 1 page

Blé

Stades : Début epiaison (10.2) à fin floraison (10.5.3)

Maladies foliaires

Dans les parcelles où la pression septoriose ou rouille brune était très importante, on note que les sous dosages de fongicide n'ont pas assuré une bonne maîtrise des maladies. Un délai de plus de quatre semaines entre les deux traitements peut être également la cause de cette mauvaise protection.

D'autre part les foyers de rouille jaune se multiplient.

Préconisations maladies

Vu la lente évolution phénologiques des cultures, la protection vis-à-vis des maladies foliaires devra être assurée pendant au moins quatre semaines.

Si votre dernier traitement a été réalisé fin avril à dose réduite, un renouvellement semble s'imposer dans les parcelles où la pression maladie est importante (septoriose ou rouille sur F3 ou F2). Choisir un produit également efficace sur fusariose (Horizon, Caramba...).

Pucerons des épis

On reste très loin du seuil de traitement (1 épi sur deux). Sur dix parcelles notées, on note la présence de pucerons dans seulement deux parcelles avec des taux d'attaques très faibles (2 et 4 %).

Tournesol

Cotylédons (A2) à 4/6 feuilles

Sur les semis tardifs, les limaces restent le principale problème. Surveillez bien les bords de parcelles.

Pour les tournesols actuellement au stade 4 à 6 feuilles, les pucerons sont bien présents avec des populations variant de 5 à 15 pucerons par pied.

Les auxiliaires sont également présents dans la majorité des parcelles et devraient permettre de maintenir les populations en dessous du seuil d'intervention.

Dans les parcelles au stade 4 à 6 feuilles effectuez un comptage en début de semaine prochaine afin de vérifier si le seuil d'intervention est atteint. Si vous notez la présence de beaucoup d'auxiliaires, aucune intervention ne doit être réalisée car les populations de pucerons seront maîtrisées en une semaine. Seuil d'intervention : 30 à 50 pucerons par pied.

Maïs

Semis en cours à 5 feuilles

Le risque limaces est important.

Blé

La protection fongicide doit être en place.

Tournesol

Attention aux pucerons.

Service Régional de la Protection des Végétaux
Site de Marmilhat BP 45
63370 LEMPDES
Tél. 04.73.42.14.83
Fax 04.73.90.83.70

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de la DRAF AUVERGNE

Le Directeur gérant : D. DIDELOT

Publication périodique
C.P.P.A.P n°23145AD
ISSN n°1254.6372

Tarifs : Courrier : 350 F
Fax : 320 F



12406 47245